

FLORE

L'anémone sylvestre

À l'ombre des sous-bois



Les anémones se caractérisent par un grand nombre d'étamines, ce qui facilite la pollinisation par les insectes [Printemps 2009]

La plante se développe exclusivement en milieu forestier et sous couvert. Caduque mais pérenne, elle se renouvelle par la croissance de son rhizome souterrain. Lorsqu'elle est grande ouverte, la fleur montre des sépales blancs. Lorsqu'elle se referme, ce qui est le cas la nuit et par mauvais temps, la fleur s'incline vers le sol, laissant alors apparaître une face extérieure rosée à violacée. Plante plutôt précoce, l'anémone termine sa floraison avant que le feuillage des arbres ne vienne assombrir les sous-bois. Preuve, s'il en était encore besoin, que la nature est vraiment bien faite ! Vous la trouverez sans peine en forêt de Nuailly-Chanteloup, et, à Toutlemonde, sur les routes de la Challore et de la Bénestière.

Anemone nemorosa

Noms communs	anémone sylvestre, anémone sylvie, sylvie, anémone des bois, coqueret blanc, anémone sanguinaire, fleur de Pâques, grenouillette blanche, bassinet blanc
Famille	Renonculacées
Étymologie	grec <i>anemos</i> , vent, et latin <i>sylva</i> , forêt
Floraison	mars - avril
Taille de la fleur	2 à 4 cm de large
Aspect de la fleur	6 à 8 pièces florales blanches, rosées à l'extérieur, nombreuses étamines
Statut de la plante	présente sur notre commune
Habitat	bois et forêts, buissons



Une fleur solitaire à l'extrémité d'un long pédoncule garni de trois feuilles

Texte et photos : Gérard Hamon